



معاونت درمان

راهنمای تجویز داروی

Calcipotriol+ Betamethasone

تابستان ۱۴۰۲

تنظیم و تدوین اولیه :

جناب آقای دکتر ملکی دبیر بورد رشته تخصصی بیماری های پوست

جناب آقای دکتر کلاتر هرمزی دبیر بورد رشته فوق تخصصی جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

جناب آقای دکتر شیاری دبیر بورد رشته فوق تخصصی روماتولوژی کودکان

جناب آقای دکتر جمشیدی دبیر بورد رشته فوق تخصص روماتولوژی

جناب آقای دکتر سلام زاده رییس انجمن علمی داروسازان بالینی

سرکار خانم دکتر علیمردانی متخصص داروسازی بالینی

سرکار خانم دکتر ضیایی متخصص داروسازی بالینی

سرکار خانم دکتر الناز ذوقی متخصص داروسازی بالینی

جناب آقای دکتر اصغرپور دکتری داروسازی عمومی

با همکاری:

دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت سازمان غذا و دارو

مشاور: دکتر ساناز بخشنده رییس گروه تدوین استاندارد و راهنمای بالینی معاونت درمان

تحت نظارت فنی:

گروه تدوین استاندارد و راهنمای بالینی

دفتر ارزیابی فن آوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت

بسمه تعالی
راهنمای تجویز دارو

نام دارو	محل تجویز و کاربرد دارو	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	اندیکاسیون	کنترا اندیکاسیون	دوز و تواتر مصرف دارو	شرایط تجویز
Calciptriol+ Betamethasone Gel, ointment topical: Calciptriol 0.005% + Betamethasone (as Dipropionate) 0.064%	بستری سرپایی	متخصص پوست فوق تخصص روماتولوژی کودکان فوق تخصص روماتولوژی بزرگسال *فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی	-پسوریازیس پلاکی -پسوریازیس ناخن -بیماری پوستی مورفه آ	-حساسیت به کلسی پوتریول، بتامتازون یا هر یک از اجزای فرمولاسیون - عفونت‌های پوست اعم از ویروسی (هرپس سیمپلکس، واریسلا واکسینیا)، باکتریایی و قارچی و انگلی ؛ توبرکلوزیس پوستی؛ عفونت‌های سفلیسی پوست (فقط ژل و پماد) ؛ -مصرف چشمی (فقط ژل و پماد) ؛ - مشکلات متابولیسمی کلسیم؛ -درماتیت اطراف دهان؛ پوست آتروفیک؛ استریای آتروفیک ؛ ایکتیوز ؛ شکننده شدن رگ‌های پوست؛ آکنه	اطفال : کودکان ≤ 12 سال: پماد موضعی: در ناحیه درگیر روزانه یک بار تا ۴ هفته استفاده شود. حداکثر مقدار مصرف هفتگی: کودکان ≤ 12 سال و کمتر از ۱۸ سال: ۶۰ گرم در هفته نوجوانان ≤ 18 سال: ۱۰۰ گرم در هفته. بزرگسال : ژل : روزانه یکبار در ناحیه کف سر تا ۴ هفته و در سایر نواحی درگیر بدن تا ۸ هفته استفاده شود.	-استفاده در بیش از ۳۰٪ سطح بدن توصیه نمی‌شود. - پس از کنترل بیماری قطع شود . - در کودکان شکل دارویی پماد مورد تایید است.

نام دارو	محل تجویز و کاربرد دارو	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	اندیکاسیون	کنترا اندیکاسیون	دوز و تواتر مصرف دارو	شرایط تجویز
				وولگاریس؛ آکنه روزاسه؛ روزاسه؛ زخم‌ها، قرمزی بعد از واکسن (فقط پماد)؛ خارش اندام تناسلی و مقعدی (فقط ژل)؛ پسوریازیس پوسچولار و اکسفولیاتیو؛ - بیماری‌های شدید کبدی (فقط ژل)؛ نارسایی‌های شدید کلیوی (فقط ژل). در پسوریازیس خفیف تا متوسط در بیماران دارای اختلال عملکرد کبد و کلیه نیازی به تنظیم دوز دارو نیست ولی در بیماران دارای پسوریازیس شدید و اختلال همزمان عملکرد کبد یا کلیه مصرف دارو ممنوع است.	حداکثر مقدار مصرف در روز ۱۵ گرم و در هفته ۱۰۰ گرم است (با احتساب سایر فراورده‌های حاوی کلسی پتریول). استفاده در بیش از ۳۰٪ سطح بدن (شامل بدن و کف سر) توصیه نمی‌شود. پس از قطع ممکن است درمان برای عود مجدد انجام شود. پماد: ۱ بار در روز تا ۴ هفته در ناحیه درگیر استفاده شود (بیشترین مقدار مصرف در هفته ۱۰۰ گرم است). استفاده در بیش از ۳۰٪ سطح بدن توصیه نمی‌شود. در صورت کنترل درمان قطع شود. در پسوریازیس ناخن به میزان یکبار در روز بر روی بستر ناخن و زیر ناخن و چین اطراف ناخن استعمال شود. مدت درمان ۳ ماه و در صورت عدم وجود شواهد پاسخ دهی بعد از ۳ تا ۶ ماه توصیه به ادامه درمان با داروهای خط دوم میشود.	

نام دارو	محل تجویز و کاربرد دارو	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	اندیکاسیون	کنترل اندیکاسیون	دوز و تواتر مصرف دارو	شرایط تجویز

- اقدامات مورد نیاز قبل از تجویز دارو (اقدامات پاراکلینیک و ...)
- * بیماری پوستی ذکر شده کاندید عمل جراحی
- در افرادی که در ریسک افزایش سطح سرمی کلسیم هستند، سطح سرمی پایه کلسیم و به صورت دوره‌ای در طول درمان اندازه گیری شود. در صورت بروز هایپرکلسمیا و یا هایپرکلسیوریا درمان موقتا تا بازگشت سطح کلسیم به حالت نرمال قطع شود.

•

• **توصیه ها :**

- قبل و بعد از استفاده دست‌ها شسته شود.
- بطری ژل قبل از مصرف تکان داده شود.
- در صورت، زیر بغل، کشاله ران و یا در صورت وجود آتروفی در محل قبل از شروع درمان، استفاده نشود.
- برای استفاده خوراکی، چشمی و واژینال نمی‌باشد.
- از پانسمان‌های پوشاننده مگر در صورت توصیه پزشک در ناحیه استفاده نشود.
- در صورت استفاده برای پوست سر بعد از مصرف مو شسته نشود و با ۱۲ ساعت فاصله از سایر درمانهای موضعی مربوط به مو استفاده شود.

• **منابع:** uptodate