



معاونت درمان

راهنمای تجویز داروی

فسفومیسین

Fosfomycin

پاییز ۱۴۰۲

تنظیم و تدوین اولیه :

آقای دکتر کریمی دبیر محترم بورد رشته فوق تخصص عفونی کودکان
آقای دکتر طبرسی دبیر محترم بورد رشته تخصصی بیماری های عفونی و گرمسیری
آقای دکتر عین اللهی جانشین محترم دبیر بورد رشته فوق تخصصی نفرولوژی
خانم دکتر محکم جانشین محترم دبیر بورد رشته فوق تخصصی نفرولوژی کودکان
آقای دکتر سلام زاده دبیر محترم بورد و رییس انجمن علمی متخصصین داروسازان بالینی ایران
خانم دکتر مخدومی دبیر محترم بورد رشته تخصصی بیماری های داخلی
آقای دکتر هاشمیان جانشین محترم دبیر بورد رشته فوق تخصصی مراقبت های ویژه
خانم دکتر ذوقی متخصص فارماکوتراپی
سرکار خانم دکتر ضیایی متخصص فارماکوتراپی
سرکار خانم دکتر علیمردانی متخصص فارماکوتراپی
آقای دکتر مهدوی دکتری داروسازی عمومی
خانم دکتر طباطبایی فوق تخصص عفونی کودکان
تأییدیه نهایی:

دکتر سعید کریمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاون محترم درمان
مشاور: دکتر ساناز بخشنده رییس گروه تدوین استاندارد و راهنمای بالینی معاونت درمان

تحت نظارت فنی:

گروه تدوین استاندارد و راهنمای بالینی
دفتر ارزیابی فن آوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت

بسمه تعالی
راهنمای تجویز دارو

نام دارو	محل تجویز و کاربرد دارو	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	منع مصرف	اندیکاسیون	دوز و تواتر مصرف دارو	شرایط تجویز
فسفومايسين Fosfomycin - گرانول برای تهیه محلول خوراکی ۳ g	بستری سرپایی	- متخصص داخلی فوق تخصص و فلوشیپ های مربوطه -متخصص اطفال و فوق تخصص و فلوشیپ های مربوطه -متخصص اورولوژی فوق تخصص و فلوشیپ های مربوطه -متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری	-حساسیت به فسفومايسين يا اجزاءديگر فرمولاسيون -فرمولاسيون خوراکی در درمان آبسه های پری نفریک و پیلونفریت	۱- عفونت مجاری ادراری	<u>بزرگسالان:</u> -باکتریوری بدون علامت ($\geq 10^5$ CFU/mL) در بارداری: خوراکی ۳ g تک دوز. -سیستیت، حاد غیر پیچیده یا ساده (عفونت محدود به مثانه بدون علائم مجاری فوقانی، پروستات، یا عفونت سیستمیک): ۳ g تک دوز. رژیم مولتیپل دوز: ۳ g هر ۲-۳ روز برای ۳ دوز در موارد UTI مقاوم -سیستیت، پیشگیری از عفونت راجعه (داروی جایگزین): طول مدت درمان بین ۳ تا ۱۲ ماه، با ارزیابی دوره ای است. ۳ g یک بار هر ۱۰-۷ روز. -عفونت ادراری مقاوم: ۳ گرم خوراکی هر ۲-۳ روز برای سه دوز	- مصرف محدود به موارد مقاوم به سایر آنتی بیوتیکها

نام دارو	محل تجویز و کاربرد دارو	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	منع مصرف	اندیکاسیون	دوز و تواتر مصرف دارو	شرایط تجویز
فسفومايسين -تزریقی: پودر ۲ g، پودر ۴ g، پودر ۸ g	-متخصص نورولوژی -متخصص زنان و زایمان - متخصص طب اورژانس -متخصص جراح عمومی فوق تخصص و فلوشیپ های مربوطه -متخصص جراح مغز و اعصاب -فلوشیپ / فوق تخصص مراقبت های ویژه (ICU)			۲- عفونت خون ۳- عفونت مفصل و استخوان ۴- اندوکاردیت عفونی ۵- عفونت داخل شکمی پیچیده ۶- پنومونی بیمارستانی یا مرتبط با ونتیلاتور ۷- عفونت پوست و بافت نرم ۸- مننژیت باکتریایی	بزرگسالان: ۱۷: ۱۲-۲۴ g/day در ۲ تا ۳ دوز منقسم (ماکزیمم ۸ g/dose). رژیم های با دوز بالا (بیش از ۱۶ g در روز) را برای عفونت های شدید شناخته شده که توسط ارگانیسم های با حساسیت کاهش یافته ایجاد میشوند رزرو کنید. -توجه: در مننژیت دوز روزانه ۱۲-۲۴ گرم در ۳-۴ دوز منقسم داده میشود.	هر ۲ گرم از دارو به مدت ۱۵ دقیقه انفوزیون شود.

نام دارو	محل تجویز و کاربرد دارو	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	منع مصرف	اندیکاسیون	دوز و تواتر مصرف دارو	شرایط تجویز
فسفومايسين	-تزریقى: پودر ۲ g، پودر ۴ g، پودر ۸ g			۹- عفونت مجاری ادراری، پیچیده (از جمله پیلونفریت):	<u>۱۷</u> : ۲۴-۱۲ g/day در ۲ تا ۳ دوز منقسم (ماکزیمم ۸ g/dose). طول مدت درمان ۵ تا ۱۴ روز، براساس پاسخ بالینی.	<u>بزرگسالان</u> :

نام دارو	محل تجویز و کاربرد دارو	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	منع مصرف	اندیکاسیون	دوز و تواتر مصرف دارو	شرایط تجویز
				۱۰-کودکان: استئومیلیت، مننژیت باکتریایی، عفونت مجاری تنفسی، عفونت پیچیده مجاری ادراری: ۱۰ Kg-: ۲۰۰ تا ۳۰۰ mg/kg/day در ۳ دوز منقسم ۱۰ Kg-: ۴۰ تا ۲۰۰ mg/kg/day در ۳ تا ۴ دوز منقسم ۴۰ Kg-: ۱۲ تا ۲۴ g/day در ۲ تا ۳ دوز منقسم؛ ماکزیمم دوز: ۸ g/dose. البته در این گروه وزنی در اندیکاسیون مننژیت باکتریایی دوز روزانه ۱۶-۲۴ گرم در ۳-۴ دوز منقسم داده میشود. و در عفونت ادراری پیچیده ۱۲ تا ۱۶ g/day در ۲ تا ۳ دوز منقسم، ماکزیمم دوز: ۸ g/dose. خوراکی: زیر ۱۲ سال: ۲ گرم تک دوز بالای ۱۲ سال: ۳ گرم تک دوز	کودکان: ۱۷: ۱۰ Kg-: ۲۰۰ تا ۳۰۰ mg/kg/day در ۳ دوز منقسم ۱۰ Kg-: ۴۰ تا ۲۰۰ mg/kg/day در ۳ تا ۴ دوز منقسم ۴۰ Kg-: ۱۲ تا ۲۴ g/day در ۲ تا ۳ دوز منقسم؛ ماکزیمم دوز: ۸ g/dose. البته در این گروه وزنی در اندیکاسیون مننژیت باکتریایی دوز روزانه ۱۶-۲۴ گرم در ۳-۴ دوز منقسم داده میشود. و در عفونت ادراری پیچیده ۱۲ تا ۱۶ g/day در ۲ تا ۳ دوز منقسم، ماکزیمم دوز: ۸ g/dose. خوراکی: زیر ۱۲ سال: ۲ گرم تک دوز بالای ۱۲ سال: ۳ گرم تک دوز	

• اقدامات مورد نیاز قبل از تجویز دارو (اقدامات پاراکلینیک و ...)

• فرم وریدی:

چک سرم کراتینین، سدیم،

از آنجا که هر گرم از فرم وریدی حاوی ۳۲۰ mg سدیم میباشد. تجویز دوزهای بالاتر از ۱۶ گرم در روز بایستی با احتیاط انجام شود.

• توصیه ها :

• خوراکی: همیشه قبل از مصرف با ۹۰ تا ۱۲۰ میلی لیتر آب خنک مخلوط شود. به صورت خشک مصرف نشود یا با آب داغ مخلوط نشود. ممکن است بدون توجه به وعده های غذایی تجویز شود.

• نشان داده شده است که فسفومایسین تک دوز، باعث پاکسازی باکتری های ادرار زنان باردار تحت درمان با باکتریوری بدون علامت می شود. با این حال، پیامدهای بالینی (مانند پیلونفریت و زایمان زودرس) پس از درمان با یک دوز، در بارداری به اندازه کافی مطالعه نشده است. در صورت نیاز به درمان، در حال حاضر یک رژیم ۴ تا ۷ روزه با آنتی بیوتیک مناسب توصیه می شود.

• موارد احتیاط: کاربرد طولانی این دارو باعث عفونت ثانویه باکتریایی و قارچی شده که تا دو ماه بعد از مصرف این آنتی بیوتیک دیده شده است.

• مصرف به موارد مقاوم به سایر آنتی بیوتیک ها محدود شود.

• تنظیم دوز فرم وریدی دارو :

بر اساس کلیرانس کراتی نین (1.73 mL/minute/1.73 m2):

- ≤ 13 : ۲۴ g/day در ۳ تا ۴ دوز منقسم در همه اندیکاسیونها به جز در عفونت ادراری تجویز شود.
- ۴۰-۱۳۰: ۱۰۰٪ دوز روزانه (بر اساس اندیکاسیون) در ۲ تا ۴ دوز منقسم تجویز شود.
- ۳۰-۴۰: ۷۰-۸۰٪ دوز روزانه (بر اساس اندیکاسیون) در ۲ تا ۳ دوز منقسم تجویز شود.
- ۲۰-۳۰: ۵۰-۷۰٪ دوز روزانه (بر اساس اندیکاسیون) در ۲ تا ۳ دوز منقسم تجویز شود.
- ۱۰-۲۰: ۳۰-۵۰٪ دوز روزانه (بر اساس اندیکاسیون) در ۲ تا ۳ دوز منقسم تجویز شود.

○ > ۱۰: ۲۰-۳۰٪ دوز روزانه (بر اساس اندیکاسیون) در ۱ تا ۲ دوز منقسم تجویز شود.

- در اختلالات کبدی نیاز به تنظیم دوز نمیباشد
- در بارداری و شیردهی توصیه نمیشود.

• منابع:

-Uptodate 2023