

فرآیند اداره بیمار با علائم تنفسی حاد در مراکز درمانی سرپایی

موارد نیازمند بستری:

(a) شواهدی از تنفس مشکل در بیمار باشد (رتراکسیون فضاهای بین دنده ای و سوپر استرنال یا استفاده از عضلات فرعی تنفس)

(b) کاهش هوشیاری و در شیر خواران خواب آلودگی شدید یا بیقراری شدید

(c) تعداد تنفس بیش از ۳۰ در بالغین، بیش از ۵۰ در اطفال زیر یک سال و بیش از ۴۰ در اطفال بالاتر از یک سال




(d) فشار خون بیمار کمتر از 90/60 باشد

(e) رنگ خلط بیمار تغییر کرده و یا خونی شده است

(f) بیمار به اندازه کافی هیدراته نیست (حجم و دفعات دفع ادرار، تورگور پوست و فشار خون ارتواستاتیک)

(g) بیمار سیانوزه است و O2 sat زیر ۹۰ در هوای اتاق می باشد و یا در CXR شواهد پنومونی باشد.

(h) سایر اندیکاسیون های بستری



گروه های پرخطر شامل:

(a) سالمندان (افراد بالای ۶۵ سال)

(b) ساکنین آسایشگاه ها و کارکنان آن

(c) بیماران مبتلا به بیماری های مزمن (ریوی از جمله آسم، قلبی - عروقی به جز هایپرتانسیون، خونی، کلیوی، کبدی، متابولیک از جمله دیابت ملیتوس)

(d) بیماران مبتلا به بیماری هایی که سیستم تنفسی را مختل می نمایند، از جمله بیماری های احتقانی، صدمات نخاعی، اختلالات صرعی، اختلالات عصبی عضلانی.

(e) افرادی که به هر دلیل سیستم ایمنی تضعیف شده باشد

(f) خانم های باردار و یا شیرده تا ۴۲ روز بعد از زایمان (یا سقط)

(g) کودکان و نوجوانان ۶ ماهه تا ۱۸ ساله ای که تحت درمان طولانی مدت با آسپرین می باشند

(h) کودکان ۶ ماه تا ۴ سال (۵۹ ماه)

(i) افراد خیلی چاق

(j) افراد فاقد طحال