

اندیکاسیون های تجویز داروها

نام دارو	محل تجویز دارو	تخصص تجویز کننده	اندیکاسیون تجویز دارو
انسولین	سرپائی ، بستری موقت و بستری	فوق تخصص غدد بزرگسال/ فوق تخصص غدد اطفال/ متخصص داخلی/ متخصص اطفال/ متخصص زنان و زایمان/ پزشک عمومی	دیابت تیپ I
			دیابت بارداری
			بیماران مبتلا به دیابت تیپ II که: $FBS < 250 \text{ mg/dl}$ یا $HbA1C < 10\%$ یا $BS < 300 \text{ mg/dl}$ یا علائم بالینی شدید دیابت
			عدم پاسخ به درمان خوراکی در دیابت نوع ۲
			عدم امکان استفاده از داروهای خوراکی کاهنده قند در شرایط خاص بالینی
			دسترسی سریع به کنترل قند خون (DKA یا HHS)
			دیابت نوزادی (هیپر گلیسمی) قند خون بالاتر از $250-300 \text{ mg/dl}$

نام دارو	محل تجویز دارو	تخصص تجویز کننده	اندیکاسیون تجویز دارو
پاکلی تاکسل آلبومین باند	سرپائی ، بستری	فوق تخصص خون وانکولوژی، متخصص رادیوتراپی و رادیوانکولوژی	سرطان پانکراس
			آدنوکارسینومای متاستاتیک غیر قابل علاج پانکراس
			کارسینومای موضعی غیر قابل علاج پانکراس
			سرطان ریه
			سرطان ریه از نوع غیر سلول کوچک (Non-Small Cell Lung Cancer ؛ NSCLC) پیشرفته موضعی
			سرطان ریه از نوع غیر سلول کوچک (Non-Small Cell Lung Cancer ؛ NSCLC) پیشرفته متاستاتیک
			سرطان پستان
			شکست شیمی درمانی ترکیبی برای بیماری متاستاتیک عود بیماری طی ۶ ماه از شیمی درمانی ادجوانت

نام دارو	محل تجویز دارو	تخصص تجویز کننده	اندیکاسیون تجویز دارو
میزوپروستول PGEI	بستری/ بستری موقت/ سرپایی	متخصص زنان و زایمان	سقط درمانی به صورت مونوتراپی
			سقط خود به خودی ناکامل و ناقص در ۳ ماه اول
			سقط ناقص در سه ماهه اول بارداری
			القای زایمان و آماده کردن سرویکس (در هفته ۲۷ بارداری و بالاتر)
			Stillbirth
			مرگ جنین
			آماده کردن سرویکس قبل از انجام پروسیجر (قبل از هفته ۲۰ بارداری)
پروفیلاکسی PPH			

نام دارو	محل تجویز دارو	تخصص تجویز کننده	اندیکاسیون تجویز دارو
Anti-Thymocyte Immunoglobulin (rATG)	بستری/ بستری موقت/	/جراح فلوشیپ پیوند کبد / فوق تخصص گوارش / جراح فلوشیپ پیوند کلیه ، قلب /نفرولوژیست / جراح فلوشیپ پیوند ریه و فوق تخصص ریه/ فوق تخصص نارسایی قلب	پیوند کبد
			رد پیوند سلولار مقاوم به استروئید
			پیوند روده
			درمان رد پیوند متوسط تا شدید یا موارد مقاوم به استروئید
			پیوند پانکراس
			پیوند ریه
			پیوند قلب

نام دارو	محل تجویز دارو	تخصص تجویز کننده	اندیکاسیون تجویز دارو
انوکسپارین	بستری/ بستری موقت/ سرپائی	متخصص داخلی ، متخصص جراحی عمومی، متخصص ارتوپدی، متخصص قلب و عروق، متخصص زنان و زایمان ، و متخصص رادیوانکولوژی، فوق تخصص خون وانکولوژی اطفال و بزرگسال،متخصص مغز و اعصاب، متخصص اطفال	تعویض مفاصل ران
			تعویض مفاصل زانو
			تعویض مفصل لگن
			شکستگی استخوانهای بزرگ
			جراحی های ماژور ارتوپدی
			ترومای شدید
			جراحی آرتروسکوپی زانو
			پروفیلاکسی علیه VTE در بیماران high risk جراحی bariatric
			پروفیلاکسی علیه VTE در بیماران مدیکال
			بیماران قبلی دارای دریچه مصنوعی قلب یا سایر اندیکاسیون های دیگر
			پیشگیری از DVT در بیماران کاندید شیمی درمانی
			بارداری
			ترومبوز حاد التهابی مادرزادی یا اکتسابی کودکان
			ترومبوز وریدی در بیماران ایسکمیک استروک
درمان انواع VTE شامل DVT و PE			

نام دارو	محل تجویز دارو	تخصص تجویز کننده	انديکاسيون تجویز دارو
IVIg	بستری / بستری موقت	متخصص داخلی،	بیماری میاستنی گراویس
		متخصص عفونی،	قبل از پیوند کلیه و کاندید پیوند نازایی
		متخصص نورولوژی،	صرع مقاوم کودکان (Intractable Childhood Epilepsy)
		متخصص اطفال،	سندروم West
		متخصص ارولوژی،	سندروم Lennox-Gastaut
		متخصص زنان و زایمان و	Lambert-Eaton syndrome
		فوق تخصص خون	سندرم گیلن باره
		و انکولوژی، فوق	نوروپاتی حرکتی چند کانونی (Multifocal Motor Neuropathy)
		تخصص نوزادان،	Anti MAG neuropathy
		فوق تخصص	CIDP (Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy)
		روماتولوژی و	بیماری کاوازاکی
		ایمونولوژی و آلرژی	لوسمی لنفوسیتیک مزمن B-cell با هیپوگاماگلوبولینمی که دچار عفونت های مکرر می شوند.
			ITP
			(Werlhof syndrome)
			نقص ایمنی هومرال اولیه
			نقص ایمنی هومرال ثانویه
			پیشگیری از عفونت باکتریال در بیماران هیپوگاماگلوبولینمی
			ابتلای راجعه به عفونت های باکتریایی مرتبط با B_cell در CLL یا مولتیپل میلوما، لنفوم غیر هوچکین، پیوند مغز استخوان / درمان ایمونوساپرس
			پیشگیری از عفونتهای باکتریال در گیرندگان آلوژنیک مبتلا به هیپوگاماگلوبولینمی (IgG < 400Mg/dl) که کمتر از ۱۰۰ روز از پیوندشان گذشته است.
			درمان کریز هایپر همولیتیک مقاوم به سایر درمان ها (مانند کورتیکواستروئیدها)
			درمان زردی ثانویه نوزاد به بیماری همولیتیک مرتبط با ناسازگاری Rh یا ABO
			ترومبوسیتوپنی آلو ایمنی نوزادی
			پلی میوزیت
			درماتومیوزیت
			میوزیت نکروزانت
			به عنوان درمان پیشگیری قبل و بعد از مواجهه با هپاتیت A
			پروفیلاکسی بعد از مواجهه با سرخک در شیرخوار زیر ۱۲ ماه
	پروفیلاکسی بعد از مواجهه با سرخک در زنان بارداری که شواهد ایمنی نسبت به سرخک ندارند		
	پروفیلاکسی بعد از مواجهه با سرخک در افراد یکه نقص ایمنی شدید دارند		
	پروفیلاکسی بعد از مواجهه با سرخک در شیرخواران بالای ۱۲ ماه که منع مصرف نسبت به دریافت واکسن MMR دارند.		
	پروفیلاکسی بعد از مواجهه با سرخچه در مادران بارداری که تمایلی به سقط جنین ندارند.		
	پروفیلاکسی بعد از مواجهه با واریسلا در صورتیکه ایمونوگلوبولین واریسلا زوستر در دسترس نباشد.		
	درمان سندروم نقص ایمنی هورمونی اولیه (آگاماگلوبولینمی مادرزادی، سندروم نقص ایمنی شدید combined، نقص ایمنی common variable، نقص ایمنی وابسته به X، سندروم ویسکوت-آلدريج)		
	درمان آلوایمونیزاسیون پلاکتی یا پورپورای بعد از تزریق خون		

درمان آپلازی مقاوم گلوبولهای قرمز			
درمان سندروم Lambert Eaton			
درمان صرع مقاوم کودکان			
درمان سندروم Orseclum myoclonus			
درمان آنسفالومیلیت حاد منتشر شدید (ADEM) که به درمان با گلوکوکورتیکوئید پاسخ نمیدهند.			
آنسفالیت اتوایمیون anti-NMDA receptor			
درمان سندروم Stiff-Person در بیمارانی که گلوکوکورتیکوئیدها را تحمل نمیکنند یا به آن پاسخ نمیدهند .			
درمان سندروم (TTP-HUS) عود کننده یا مقاوم به درمان			
پیشگیری از آنوریسم شریان کرونری همراه با سندروم کاوازاکی همراه با آسپرین			
درمان regection هورمونی حاد در بیماران پیوند کلیه به همراه پلاسمافرزیس			
حساسیت زدایی بیماران با حساسیت بالا ($PRA > 20\%$) منتظر پیوند کلیه			
درمان نفروپاتی BK در بیماران پیوند کلیه			
درمان نفروپاتی شدید IgA			
درمان (birdshot retinochoroidopathy یووئیت خلفی اتوایمیون دوطرفه)			
درمان ITP ناشی از HIV ، عفونتهای شدید ،			
آنمی ناشی از عفونت parvovirus B19			
درمان بیماریهای CMV (پنومونی، رتینیت) به همراه گانسیکلوویر در بیمار HIV یا پیوند			
درمان MS عودکننده زمانیکه سایر روشهای درمانی قابل انجام نباشند.			
درمان درماتومیوزیت سیستمیک مقاوم به گلوکوکورتیکوئید			
پلی میوزیت مقاوم به گلوکوکورتیکوئید			
درمان واسکولیت مقاوم سیستمیک			
درمان لوپوس مقاوم (SLE)			
درمان adult-onset still disease			
درمان سندروم آنتی فسفولیپید مقاوم			
درمان سندروم استیون جانسون شدید در مراحل اولیه			
درمان نکروزیتو توکسیک اپیدرمال نکرولولوزیس			
درمان سپسیس شدید در بیماران critically ill که تحت درمان با آنتی بیوتیک های وسیع الطیف میباشدند			
درمان PTLD به همراه شیمی درمانی			
پیشگیری از سقط راجعه خودبخودی			
در بیماران مبتلا به MS در شرایط خاص مثل بارداری و بعد از زایمان			
در بیماران NMOSD در صورت عدم پاسخ به استروئیدها یا بروز عوارض آن			
در بیماران MOGAD در صورت عدم پاسخ به استروئیدها یا بروز عوارض آن			
در نوزادان Alloimmune thrombocytopenia(NCBI)			
نوزادان متولد شده از مادران دچار ITP			
در سندروم ALPS			
در سندروم Evans			
آنمی های حاد همولیتیک اتوایمیون که به استروئید و ریتوکسی ماب پاسخ نمی دهند یا نسبت به این درمان ها ممنوعیت دارند			